

# REKRUTIERENDE STUDIEN

## GRAFT-VERSUS-HOST-DISEASE (GVHD)

**UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG**  
**Klinik für Innere Medizin I**  
**Interdisziplinäres Tumorzentrum**

Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation  
Sektion Klinische Studienzentrale und Early Clinical Trial Unit (ECTU)

Hugstetter Str. 55  
D-79106 Freiburg

✉ **Kontakt:** [med1.kontakt.studienzentrale@list.uniklinik-freiburg.de](mailto:med1.kontakt.studienzentrale@list.uniklinik-freiburg.de)

**Stand bei Drucklegung**

**Herausgeber:** Universitätsklinikum Freiburg © 01/2025

Redaktion: Klinik für Innere Medizin I - Universitätsklinikum Freiburg

Gestaltung: Maryna Stamatova, Klinik für Innere Medizin I - Universitätsklinikum Freiburg

Bildnachweis: © Universitätsklinikum Freiburg | © AdobeStock



## Akut

### 1. line

### 2. line

#### MC0518/IDUNN

**Phase:** III  
**IMP:** Mesenchymal Stromal Cells vs. BAT  
**PI:** Prof. Dr. Robert Zeiser  
**Study Nurse:** Susanne Kappes Tel: 32917  
**Wichtige In/Exclusion:**  
Steroidrefraktäre aGvHD

#### AURORA

**Phase:** II  
**IMP:** RLS-0071  
**PI:** Prof. Dr. Robert Zeiser  
**Study Nurse:** Ina Hilbert, Tel: 32908  
**Wichtige In/Exclusion:**  
Steroidrefraktäre akute GvHD, Grad II-IV, angestrebte Hospitalisierung für mind. 1 Woche, ANC > 500;  
Ausschluss: > 1 Allo-HSCT, zusätzliche GvHD-Medikation, Ruxolitinib-Versager, chronische GvHD, keine weitere

## Chronisch

#### ROCKnrol-1

**Phase:** III  
**IMP:** Belumosudil  
(Inhibition von Rhoassoziierten Proteinkinasen ROCK1 und ROCK2) + Corticosteroide  
**PI:** Prof. Dr. Robert Zeiser  
**SN:** Orsolya Lantos Tel: 32927  
**Wichtige In/Exclusion:**  
Keine Drittlinientherapie für cGvHD, kein Rezidiv der Grunderkrankung nach 3 Salvage-Therapiezyklen i.R. der Studie

#### INCA 34176-254

**Phase:** II  
**IMP:** Axatilimab (Anti-CSF-1R-AK) + Ruxolitinib  
**PI:** Prof. Dr. Robert Zeiser  
**SN:** Rainer Lohmüller Tel: 329077  
**Wichtige In/Exclusion:**  
Kein Rezidiv der Grunderkrankung, keine DLI-Gabe wegen MRD+

#### RUX-ECP

**Phase:** II  
**IMP:** Ruxolitinib und extrakorporale Photopherese  
**PI:** Prof. Dr. Robert Zeiser  
**SN:** Ina Hilbert, Tel: 32908  
**Wichtige In/Exclusion:**  
In: moderate bis schwere, Steroidrefraktäre cGvHD; systemische Glucocorticoide für cGvHD < 6 Monate vor Zyklus 1 Tag 1; ECOG 0-2  
Ex: Transition einer aGvHD in cGvHD; vorherige Ruxolitinib- oder ECP-Behandlung; rezidierte Grunderkrankung